

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES<sup>®</sup>

REGION CENTRE

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

Bulletin technique n° 26 du 10/09/98 - 2 pages

Grandes Cultures

## Blé

### Carie

Des cas de carie ont été signalés dans l'Est du Cher pour la récolte 1998.

*Dans les secteurs à risque où des contaminations du sol sont suspectées (les spores de ce champignon se conservent plusieurs années dans le sol), les traitements de semences à base d'oxiquinoléate de cuivre ne sont pas suffisants. Il faut utiliser des matières actives performantes : le fludioxonil, le triticonazole, le bitertanol ou thiabendazole. Consultez le dépliant Insecticides-Traitement des semences joint au précédent bulletin.*

## Colza

Les semis sont pratiquement terminés.

**Stade** : de début levée à première feuille ; 3-4 feuilles pour les semis les plus précoces du Cher (le 17 août).

### Ravageurs

- **Limaces** : On note quelques rares dégâts dans le Pays Fort du Cher et à Autrèche (37).

*Continuez la surveillance et traitez si nécessaire.*

- **Altises** : On observe de nombreuses morsures sur repousses de colza et quelques morsures sur cultures à Auzouer (37) et à Martizay (36).

*Continuez le suivi.*

- **Pucerons cendrés** : quelques pucerons

sont observés à La Chapelle Blanche (37).

- **Tenthrede de la rave** : ce ravageur avait causé des dégâts en 1997 dans le Pays Fort du Cher et à Méry es Bois (18).



La larve (voir dessin ci-dessus) est une fausse chenille qui peut dévorer entièrement le limbe des feuilles et ne laisser que les nervures. L'adulte est une mouche jaune-orangé de 6 à 8 mm.

- **Noctuelles défoliatrices** : la larve est une chenille qui dévore les feuilles ; elle est active surtout la nuit.

*Ces deux derniers ravageurs sont à surveiller.*

### Maladies

- **Suivi phoma** : la maturation des périthèces n'a pas encore commencé à Fleury les Aubrais (45).

- **A propos du mildiou** : cette maladie cause généralement peu de dégâts car la mort de quelques plantes est compensée par la croissance des plantes voisines. En cas d'attaque, on observe des décolorations sur la face supérieure des feuilles et des fructifications sur la face inférieure.

### Désherbage

Les repousses de céréales sont fréquentes, surtout dans les parcelles sans labour. Pour le choix des produits, voir le tableau ci-dessous.

Stade du colza	Stade des adventices	Produits
Tous les stades	3 feuilles à début montaison	Eloge (0,5 l/ha) Agil (1 l/ha) Ankor (1,25 l/ha + huile) Fervinal (1,5 l/ha + huile) Fusilade X2 (0,6 l/ha + mouillant) Pilot (1,2 l/ha) Stratos Ultra (2 l/ha) Targa D+ (0,5 l/ha + huile)
3 feuilles vraies à reprise		Kerb Flo (1,2 l/ha)
4-6 feuilles vraies à 3 semaines avant reprise		Legurame PM (3 kg/ha) Pradone TS (4 kg/ha)

## Céréales


Traitement des semences : attention à la carie en zones à risque. Dépliant "Herbicides" à conserver.

**D.R.A.F. CENTRE**  
Service Régional de la  
Protection des Végétaux  
93, rue de Curambourg  
BP 210  
45403 Fleury les Aubrais  
Tél. 02.38.22.11.11  
Fax 02.38.84.19.79

Imprimé à la Station  
d'Alertes Agricoles  
de la Région CENTRE  
Le Directeur-Gérant :  
M. HANRION  
Publication périodique  
C.P.P.A.P. n° 530 AD  
ISSN n° 0757-4029

# Colza : privilégier le piégeage des ravageurs

Surveillez les ravageurs au bon moment ...



La cuvette jaune est à mettre en place dès le semis ou au plus tard à la levée. Elle doit être installée à 10 mètres de la bordure, du côté d'un ancien champ de colza. Elle est remplie avec 1 litre d'eau et quelques gouttes de liquide vaisselle. Le contenu de la cuvette est relevé tous les 2 jours pour identifier et dénombrer les ravageurs piégés.

... à l'aide de la cuvette jaune

